

Matemáticas

Nivel superior

Prueba 1

Lunes 12 de noviembre de 2018 (tarde)

Número de convocatoria del alumno

2 horas

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instrucciones para los alumnos

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- En esta prueba no se permite el uso de ninguna calculadora.
- Sección A: conteste todas las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.
- Sección B: conteste todas las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto. Escriba su número de convocatoria en la parte delantera del cuadernillo de respuestas, y adjúntelo a este cuestionario de examen y a su portada utilizando los cordeles provistos.
- Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas.
- Se necesita una copia sin anotaciones del **cuadernillo de fórmulas de matemáticas NS y de ampliación de matemáticas NS** para esta prueba.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[100 puntos]**.



4. [Puntuación máxima: 7]

Considere el siguiente sistema de ecuaciones, donde $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 2x + 4y - z &= 10 \\ x + 2y + az &= 5 \\ 5x + 12y &= 2a. \end{aligned}$$

(a) Halle el valor de a para el cual este sistema de ecuaciones no tiene una solución única. [2]

(b) Halle la solución de este sistema de ecuaciones para $a = 2$. [5]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Véase al dorso

No escriba soluciones en esta página.

Sección B

Conteste **todas** las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto. Empiece una página nueva para cada respuesta.

9. [Puntuación máxima: 15]

Considere el triángulo OAB , tal que O tiene por coordenadas $(0, 0, 0)$, A tiene por coordenadas $(0, 1, 2)$ y B tiene por coordenadas $(2b, 0, b - 1)$, donde $b < 0$.

(a) Halle, en función de b , la ecuación cartesiana del plano Π que contiene a este triángulo. [5]

Sea M el punto medio del segmento de recta $[OB]$.

(b) Halle, en función de b , la ecuación de la recta L que pasa por M y es perpendicular al plano Π . [3]

(c) Muestre que L no corta al eje y para ningún valor negativo de b . [7]



No escriba soluciones en esta página.

10. [Puntuación máxima: 19]


(a) Utilice la integración por partes para mostrar que

$$\int e^x \cos 2x dx = \frac{2e^x}{5} \sin 2x + \frac{e^x}{5} \cos 2x + c, c \in \mathbb{R}. \quad [5]$$

(b) A partir de lo anterior, muestre que

$$\int e^x \cos^2 x dx = \frac{e^x}{5} \sin 2x + \frac{e^x}{10} \cos 2x + \frac{e^x}{2} + c, c \in \mathbb{R}. \quad [3]$$

La función f se define de la siguiente forma $f(x) = e^x \cos^2 x$, donde $0 \leq x \leq 5$. En el siguiente gráfico se muestra la curva $y = f(x)$. Esta curva tiene máximos locales en A y en C y toca al eje x en B y en D.



(c) Halle la coordenada x de A y de C, dando las respuestas en la forma $a + \arctan b$, donde $a, b \in \mathbb{R}$. [6]

(d) Halle el área de la región delimitada por esta curva y por el eje x entre B y D, como aparece sombreada en la figura. [5]



12EP11

Véase al dorso

No escriba soluciones en esta página.

11. [Puntuación máxima: 16]

(a) Halle todas las raíces de $z^{24} = 1$ que cumplen la condición $0 < \arg(z) < \frac{\pi}{2}$. Exprese las respuestas en la forma $re^{i\theta}$, donde $r, \theta \in \mathbb{R}^+$. [5]

(b) Sea S la suma de las raíces halladas en la parte (a).

(i) Muestre que $\operatorname{Re} S = \operatorname{Im} S$.

(ii) Escribiendo $\frac{\pi}{12}$ como $\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)$, halle el valor de $\cos \frac{\pi}{12}$ en la forma $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{c}$, donde a, b y c son números enteros.

(iii) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, muestre que

$$S = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{2})(1 + \sqrt{3})(1 + i). \quad [11]$$

